



Aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos, que incuban hasta la eclosión (Ovíparos).

Las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico, hace 150-200 millones de años. Su posterior evolución dio lugar, a las cerca de 10.000 especies actuales. Las aves son los tetrápodos (animales de 4 extremidades) más diversos.

Las aves habitan en todos los biomas. El tamaño puede ser desde 6,4 cm en el colibrí zunzuncito hasta

2,74 metros en el avestruz. Los comportamientos son diversos y notables, como en la anidación, la alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la tendencia a la asociación en grupos. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar señales visuales, llamadas y cantos. Algunas emiten gran diversidad de sonidos, y se destacan por su inteligencia.

El ser humano ha tenido una intensa relación con las aves. En la economía humana, las aves de corral y las cinegéticas son fuentes de alimento. Otras viven como mascotas. Se usa el plumón de patos y gansos domésticos para rellenar almohadas, y antes se cazaban muchas aves para adornar sombreros con sus plumas.

El guano de las aves se usa en la fertilización de suelos. Algunas aves son reverenciadas o repudiadas por motivos religiosos, supersticiones o por prejuicios erróneos.

Son más de 1.200 las especies de aves amenazadas que necesitan esfuerzos para su conservación.

La parte de la zoología que estudia las aves es la *ornitología*.

Azor común
(*Accipiter gentilis*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Posee una envergadura de 120 cm. Su coloración dorsal es parda en las hembras y color ceniza en los machos. La zona ventral es blanca con un moteado en negro horizontal y no vertical como el águila perdicera. Presentan cejas blancas sobre sus grandes ojos rojizos, que los diferencian de los halcones. El macho tiene un collar negro que cubre también el ojo. Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de Especies amenazadas).

Gavilán común (*Accipiter nisus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Similar al Azor, pero el Gavilán no tiene la ceja blanca. Mide unos 30 cm. Tiene las alas cortas redondeadas y la cola larga. Sus ojos son amarillos o anaranjados. Presenta en la cola cuatro o cinco bandas oscuras características. Sus partes superiores son gris ceniza y las inferiores pardas rojizas.

Distribuido por la mitad Norte y levante de la Península Ibérica principalmente. Más escaso en el Sur.

Especie de interés especial (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).

Águila azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Águila de mediano tamaño que puede alcanzar hasta 175 cm de envergadura, siendo los machos algo más pequeños que las hembras. Presentan un dorso pardo con pecho y vientre blancos con franjas oscuras verticales. El iris y la base del pico son amarillos y presenta una ceja blanca. Posee los dedos y garras proporcionalmente más grande de las águilas españolas. Es muy similar al azor común.

Se distribuye por el Sur peninsular y la costa mediterránea.

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía).

Águila calzada (*Hieraaetus pennatus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipritidae*

Descripción: La más pequeña de las águilas de la Península, con un tamaño similar al ratonero. Su nombre procede de tener los tarsos emplumados hasta las garras. Presenta un vientre claro y un dorso, cabeza y cuello oscuros de tonos pardos, ocre y leonados. Existen ejemplares con el vientre oscuro. Se alimenta de otras aves.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Galicia.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Águila real (*Aquila chrysaetos*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Es el águila de mayor tamaño de nuestro territorio. Puede alcanzar los 2,2 m de envergadura. Coloración parda por todo el cuerpo. Sus patas están emplumadas hasta el nacimiento de los dedos. Se alimenta de pequeños mamíferos como conejos, liebres, roedores, etc.

Se distribuye por las grandes cordilleras de la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía).

Águila culebrera (*Circaetus gallicus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Posee una longitud de hasta 70 cm y una envergadura de 160 cm. Su coloración ventral es casi blanca, aunque con moteado oscuro. Cabeza ancha y aplanada con grandes ojos de iris amarillos. Se alimenta de reptiles, principalmente culebras.

Se distribuye por casi toda la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (Catalogo Nacional de Especies Amenazadas).

Milano negro (*Milvus migrans*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Rapaz de tamaño medio, con una distintiva silueta de vuelo estilizada, de alas más bien largas y agudas, que en la Península Ibérica sólo ofrece confusión con el Milano real. La cola presenta característica horquilla, menos acusada que en el milano real. La coloración es marrón oscura, con la cabeza y el cuello más claros. Pico amarillo acabado en negro, patas claras.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Sureste.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Milano real
(*Milvus milvus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Es un ave de tamaño medio, de color predominante rojizo, rayado de oscuro en las partes ventrales y orlado en el dorso. La cabeza y cuello tiene un tono gris pálido. Sus alas son largas, con una mancha blanca bastante visible y cola muy ahorquillada. Pico amarillo terminado en negro y patas amarillas. Carnívoro con hábitos carroñeros.

Distribuida por toda la Península Ibérica excepto Costa Mediterránea, Cornisa Cantábrica y Galicia.

Especie en peligro crítico de extinción (UICN Andalucía).

Busardo ratonero (*Buteo buteo*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Rapaz de mediano tamaño con las alas relativamente largas y anchas, cola ancha y corta con forma redondeada. Coloración de la parte superior marrón oscura con líneas blancas en la cabeza. Parte inferior variable, presentando unas manchas claras debajo de las alas que se aprecian más bien en vuelo. Habita en zonas boscosas y suele nidificar en pinos.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Grado de amenaza desconocido (UICN España).

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Accipitridae*

Descripción: Rapaz diurna y carroñera de gran tamaño, con una envergadura de hasta 280 cm. Su plumaje es enteramente pardo claro excepto las alas y cola que son negras. Presenta el cuello “pelado” someramente cubierto de un delgado plumón blanco. Prefiere los parajes solitarios y anida en zonas rocosas.

Se distribuye casi toda la Península salvo el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cernícalo común (*Falco tinnunculus*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Falconidae*

Descripción: Rapaz de tamaño medio, de coloración castaño en el dorso moteado en negro, contrastando con la cabeza y cola de color gris, que termina en una franja negra. La parte inferior es de color ocre moteada en negro. Como el resto de los halcones, presenta en vuelo alas y colas puntiagudas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cernícalo primilla (*Falco neumanni*)



Orden: *Falconiformes*

Familia: *Falconidae*

Descripción: Más pequeño que el Cernícalo común. Envergadura de unos 60 cm. La cabeza y cola son gris azuladas. El dorso es pardo rojizo, sin manchas negras. Las plumas de la cola terminan en negro y se aprecia muy bien en vuelo. Las garras son blancas. Se establecen en colonias de zonas urbanas y de cultivos. Distribuida por toda la Península Ibérica salvo la Cornisa Cantábrica.

Especie casi amenazada (UICN Andalucía).

Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)



Orden: *Pelicaniformes*

Familia: *Phalacrocoracidae*

Descripción: Pueden llegar a vivir más de 20 años. Es un ave de gran envergadura, hasta 150 cm. De color muy oscuro, prácticamente negro. Cerca del pico, la garganta es de tonos amarillos anaranjados con el resto blanco. El pecho en los adultos es completamente negro y blanco en los jóvenes. Posee una cola larga y ancha. Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo zonas de alta montaña.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Paloma bravía (*Columba livia*)



Orden: *Columbiformes*

Familia: *Columbidae*

Descripción: Es la especie primitiva de la que han derivado todas las razas de palomas domésticas. Se distingue de la Paloma zurita y de la torcaz por poseer el obispillo blanco. Tiene todo el cuello de color verde y morado y no sólo una mancha como en el caso de la Paloma zurita. Es de menor tamaño que la Paloma torcaz. Características comunes al resto de palomas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Paloma torcaz
(*Columba palumbus*)



Orden: *Columbiformes*

Familia: *Columbidae*

Descripción: Es la mayor de las palomas. Puede llegar a pesar hasta 500 g. Presenta coloración azul grisácea con luminosas manchas blancas a ambos lados del cuello. Su cola es más larga que en la Paloma bravía y zurita. Tiene manchas alares blancas en forma de media luna, e iridiscencias verdes y purpúreas en el cuello. Habita tanto en bosques como en ambientes urbanos. Se distribuye por toda la Península Ibérica.
Especie de preocupación menor (UICN España).

Tórtola turca
(*Streptopelia decaocto*)



Orden: *Columbiformes*

Familia: *Columbidae*

Descripción: Mide entre 28 y 33 cm. Tienen un característico collar negro ribeteado de blanco en el cuello. Cabeza gris y algo rosada, pecho gris rosado claro, cola grisácea por encima, con punta y bordes blancos por debajo, ancha banda terminal blanca. Pico negro y patas rojizas al igual que el borde del ojo.

Hay dos variedades de color, la marrón con una ligera tonalidad gris, y la blanca.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

No está en los Catálogos de España ni Andalucía.

Tórtola común (*Streptopelia turtur*)



Orden: *Columbiformes*

Familia: *Columbidae*

Descripción: Mide de 26-29 cm. Dorso pardo claro, más gris en el capirote. Partes inferiores gris azulado y rosáceo, alas con coberteras rojizas de centro negro, cola negra con bordes blancos, cabeza y cuello grises, con barras características negras y blancas en el cuello. Pico y patas rojizos. Vive en zonas de labranza con abundante vegetación riparia arbustiva o arbórea.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía).

Mochuelo (*Athene noctua*)



Orden: *Strigiformes*

Familia: *Strigidae*

Descripción: Rapaz nocturna de pequeño tamaño, unos 25 cm. Cabeza rechoncha y achatada sin penachos de plumas. Pico verde amarillento, ceja clara y ojos amarillos. Tiene el dorso pardo con manchas redondas blancas, pecho pardo moteado en blanco. Plumas de vuelo pardas manchadas de blanco. Cola parda con fino barrado ocre. Patas emplumadas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Búho real (*Bubo bubo*)



Orden: *Strigiformes*

Familia: *Strigidae*

Descripción: Ave de gran tamaño, de aspecto críptico y color general ocre manchado de oscuro. Las alas son pardas con rayas transversales ocre. Garganta blanca, con cabeza característica, con el pico oscuro, ojos anaranjados y dos grupos de plumas en la parte superior de la cabeza que parecen grandes cejas o falsas orejas. Patas cubiertas de plumas.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Galicia.

Especie rara (UICN España).

Autillo (*Otus scops*)



Orden: *Strigiformes*

Familia: *Strigidae*

Descripción: Es una de las rapaces más pequeñas, ya que su tamaño no llega a 20 cm. Su plumaje es de tono pardo grisáceo, imitando la corteza de los árboles. Ojos grandes con iris amarillo y pupilas redondeadas y negras. El macho tiene dos penachos en la cara a ambos lados de la cabeza en forma de orejas.

Distribuida por toda la Península Ibérica aunque más abundante en el Sur, Alicante y Baleares.

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía).

Cárabo común (*Strix aluco*)



Orden: *Strigiformes*

Familia: *Strigidae*

Descripción: Es una rapaz nocturna de mediano tamaño, con forma rechoncha, gran cabeza y sin penacho de plumas sobre los ojos. El plumaje es muy críptico, con diferentes coloraciones entre individuos que van desde grises hasta rojizos. Las hembras suelen ser mayores que los machos. Hábitos forestales.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN Andalucía).

Lechuza común (*Tyto alba*)



Orden: *Strigiformes*

Familia: *Tytonidae*

Descripción: Ave relativamente grande. El dorso y partes dorsales de las alas tienen colores rojizos con tonos grises. Inconfundible disco facial claro, con forma de corazón, rodeado de plumas cortas y tonos dorados. La zona ventral es blanca. Patas parcialmente emplumadas. Es una rapaz de hábitos nocturnos. Se alimenta de pequeños roedores, pájaros e insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Garza real (*Ardea cinerea*)



Orden: *Ciconiiformes*

Familia: *Ardeidae*

Descripción: Mide unos 90 cm y puede llegar a alcanzar hasta los 170 cm de envergadura, pesando entre 1,5 y 2 kg. Plumaje de color gris en diferentes tonos, que en los adultos van desde blanco hasta negro. Cabeza blanca con una lista ocular negra y dos plumas oscuras que cuelgan desde la nuca. Pico amarillo, muy largo y fuerte. Hábitos pescadores. Patas largas típicas de ambientes encharcados.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Centro.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Garzeta grande (*Egretta alba*)



Orden: *Ciconiiformes*

Familia: *Ardeidae*

Descripción: Ave grande de plumaje blanco que llega a alcanzar 1 m de altura. Tiene un diseño con plumaje de color uniforme blanco, con pico amarillo y patas negras. En vuelo presenta el cuello retraído hacia atrás, rasgo característico de las garzas. Se alimenta de peces, anfibios, crustáceos, etc. Ave de hábitos acuáticos y migratorios.

Distribuida por todo el mundo menos regiones árticas.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Garcilla bueyera o espurgabuey (*Bubulcus ibis*)



Orden: *Ciconiformes*

Familia: *Ardeidae*

Descripción: Puede llegar a medir hasta 50 cm y una envergadura de 1 m. Presenta un plumaje blanco con pico y patas amarillo. En el pecho presentan una leve coloración crema. Tienen una cresta color crema, erizable. En época nupcial acentúan sus colores crema, el pico y las patas se vuelven rojizos.

Distribuida por la zona Suroccidental de la península Ibérica y Baleares.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cigüeña común (*Ciconia ciconia*)



Orden: *Ciconiiformes*

Familia: *Ciconiidae*

Descripción: Ave de gran tamaño, completamente blanca salvo el extremo de sus alas de color negro y el pico y las patas rojo anaranjado en los adultos. Los juveniles tienen el pico negro y las patas amarillas. Típica de ambientes humanizados.

Se distribuye por toda la zona Central-Occidental de la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (UICN España).

Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)



Orden: *Ciconiiformes*

Familia: *Ciconiidae*

Descripción: Esta especie es algo menor que la cigüeña común. Presenta un plumaje negro uniforme por todo el cuerpo salvo el vientre claro. Pico, patas y carúncula están desprovistos de plumas presentando un color rojo intenso. Patas largas típicas de ambientes encharcados. Se distribuye por toda la parte Occidental de la Península Ibérica salvo el Norte.

Especie en peligro de extinción (UICN España).

Perdiz roja
(*Alectoris rufa*)



Orden: *Galliformes*

Familia: *Phasianidae*

Descripción: Es la variedad de perdiz más distribuida en el mundo. Aspecto rechoncho, garganta de color blanco, rodeada por un babero negro que cruza los ojos. Pico y borde de los ojos rojo intenso. La mitad superior de su cuerpo tiene tonalidades marrón claro algo rojizo, mientras que el pecho es mucho más claro. El flanco presenta coloración barrada en tonos claros, rojizos y negro. Patas rojas.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Codorniz
(*Coturnix coturnix*)



Orden: *Galliformes*


Familia: *Phasianidae*

Descripción: Ave pequeña, de unos 20 cm. Cuerpo macizo, con plumaje de color pardo leonado, más oscuro en el dorso y casi blanco en el vientre. Presenta una ceja blanca sobre los ojos. Su pico es de color marrón en la parte superior, y bastante más claro en la inferior. Las patas y los pies son de color carne.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Ánade azulón o ánade real (*Anas platyrhynchos*)



Orden: *Anseriformes*

Familia: *Anatidae*

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho presenta la cabeza de color verde muy característico, con un pico amarillo, collar blanco, mitad inferior de color claro y alas de coloración marrón. La hembra presenta un pico marrón verdoso y cuerpo contrastado entre tonos pardos oscuros y claros.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zampullín común
(*Tachybaptus ruficollis*)



Orden: *Podicipediformes* **Familia:** *Podicipedidae*

Descripción: Mide unos 26 cm. El macho tiene el mentón negro, y las mejillas, cuello y pecho castaño viejo y rojizo. En invierno el mentón es blanco y las partes castañas se vuelven blancas. Posee un vuelo raso y recto con el cuello estirado, manteniéndolo por debajo del nivel del cuerpo. Se alimenta de peces pequeños, insectos y larvas. Habita en charcas, lagunas, remansos y a veces en parques de ciudades.

Distribuido por casi toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cuervo
(*Corvus corax*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Corvidae*

Descripción: Es el córvido de mayor tamaño de la Península Ibérica. Mide unos 60 cm y tiene una envergadura de 120 cm. Su color es completamente negro incluido su pico robusto. Son pájaros gregarios que a menudo aparecen en grupos de dos a seis individuos. Su canto consiste en un graznido característico.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Grado de amenaza desconocido (UICN España).

Grajilla
(*Corvus monedula*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Corvidae*

Descripción: Córvido de pequeño tamaño, mide unos 30 cm. Presenta la parte superior de la cabeza y cuello de color gris, rasgo distintivo respecto a otros córvidos. Pico y patas negras, e iris claro, son otros elementos distintivos. Se alimenta de invertebrados, semillas y desechos de comida. Habita en zonas de cultivo.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo en la Cornisa Cantábrica.

Especie de preocupación menor (España).

Rabilargo o rabúo (*Cyanopica cyana*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Corvidae*

Descripción: Córvido de pequeño tamaño y de silueta muy parecida a la urraca, con alas y colas de color celeste, cabeza con capirote negro, garganta blanca y dorso y vientre de color gris pardusco. Habita en zonas arboladas no muy espesas. Se alimenta de insectos y frutales, dependiendo de la época del año y disponibilidad de alimentos.

Se distribuye por el Suroeste de la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Arrendajo o gallito de campo (*Garrulus glandarius*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Corvidae*

Descripción: Ave de tamaño medio, aspecto rechoncho, alas redondeadas y oscuras con una banda azul clara listada de negro. Es de una coloración pardusca acabada en una cola negra y larga. En la cabeza presenta dos características propias como la bigotera oscura y la cresta moteada que se eriza.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Urraca (*Pica pica*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Corvidae*

Descripción: Ave blanca y negra de tamaño medio, con una cola bastante larga. Mide unos 40 cm de longitud. La cola presenta plumas iridiscentes verdosas y azules, al igual que las alas. Las parejas de urracas viven unidas de por vida. Viven en tierras de cultivos con setos y matorrales. Se alimentan de insectos principalmente. Se ven atraídas por objetos brillantes como monedas, chapas, cristales, etc. que llevan a su nido.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Abubilla o bobita (*Upupa epops*)



Orden: *Coraciiformes*

Familia: *Upipidae*

Descripción: Esta ave debe su nombre a su canto tan singular. La cabeza, el cuello, parte de la espalda y vientre tienen tonos anaranjados. Sus alas son negras con grandes bandas y manchas blancas. Posee una cresta habitualmente plegada, que es del mismo tono naranja que su cuerpo, con pequeñas manchas negras al final de cada pluma. Pico largo y algo curvado. Distribuida por casi toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Abejaruco europeo (*Merops apiaster*)



Orden: *Coraciiformes*

Familia: *Meropidae*

Descripción: Ave llamativa de vivos colores y unos 30 cm de longitud. Tiene un diseño azulado en la parte inferior, pardo amarillento en la parte superior, cuello amarillo que se separa del vientre por un collar negro. Presenta un antifaz en los ojos, su pico es alargado y curvo típico de especies insectívoras.

Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo la zona Noratlántica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Oriolidae*

Descripción: Ave de tamaño similar al mirlo. Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene el cuerpo amarillo intenso, con alas y cola negra. La hembra y juveniles son parecidos, con partes superiores verde oliva y partes inferiores grises finamente barradas con alas y cola parda. Tienen una mancha negra en el ojo, que es rojizo al igual que el pico, aunque este último mucho más claro. Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Martín pescador (*Alcedo atthis*)



Orden: *Coraciiformes*

Familia: *Alcedinidae*

Descripción: Es un pequeño pájaro de cuerpo rechoncho, patas y cola corta con la cabeza grande. Pico grande y recto. Tiene un diseño muy colorido y vistoso, ya que las alas y la parte posterior de la cabeza son de color azul verdoso, dorso y cola azul brillante y el vientre y las mejillas rojo anaranjado. Habita en ambientes húmedos ya que su dieta es básicamente piscícola.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía).

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Orden: *Charadriiformes* **Familia:** *Charadriidae*

Descripción: Dorso pardo, vientre blanco, con ancha franja negra en el cuello y detrás del ojo. Franja blanca en la frente. Antifaz negro, anillo ocular amarillo. Ambos sexos iguales morfológicamente. Se alimenta de insectos y habita en aguas continentales. Brinca a la pata coja cuando se encuentra en una situación de peligro.

Distribuida por casi toda la Península Ibérica.

Especie de interés especial (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).

Andarriós chico
(*Actitis hypoleucos*)



Orden: *Charadriiformes*

Familia: *Scolopacidae*

Descripción: Ave limícola de pequeño tamaño. Sus partes superiores son pardas y las inferiores blancas, con un característico entrante pálido que sube desde los lados del pecho hasta el cuello, por delante del vértice del ala. En vuelo exhibe un diseño alar característico, con una ancha franja blanca enmarcada por plumas más oscuras.

Distribuido por toda la Península ibérica aunque más abundante en el Norte.

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de Especies amenazadas).

Becada o Pitorra (*Scolopax rusticola*)



Orden: *Charadriiformes* **Familia:** *Scolopacidae*

Descripción: Ave limícola de unos 34 cm. Robusta, con pico largo y plumaje rojizo, con cabeza y partes inferiores barradas; sexos iguales. Tiene los ojos colocados en posición alta y retrasados adquiriendo una visión circular que le hace estar más pendiente de sus enemigos. Habita en bosques abiertos y se alimenta principalmente de lombrices, escarabajos, otros insectos y sus larvas. Distribuido por toda la Península ibérica aunque más abundante en el Norte.

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de Especies amenazadas).

Estornino negro (*Sturnus unicolor*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sturnidae*

Descripción: Ave de tamaño mediano, hasta unos 23 cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho adulto es de color negro lustroso con tonalidades iridiscentes. Las hembras adultas presentan una coloración que va desde el negro hasta un pardo muy oscuro. A veces se le erizan las plumas del rostro. Pico puntiagudo y amarillento. Vive en zonas urbanas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Mirlo
(*Turdus merula*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho es negro mate con el pico y el borde del ojo amarillos. La hembra es parda en el dorso, con tintes marrón rojizo en el pecho y mentón gris rayado. Los jóvenes son algo moteados. Vive en zonas arboladas, sotobosque de matorrales, huertas, etc. Se alimenta de insectos y frutos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zorzal común
(*Turdus philomelos*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Presenta dorso pardo y vientre más claro con manchas oscuras. Ceja un poco más clara que el capirote, pico oscuro con el borde más claro. Prefieren campos abiertos al bosque y se alimentan de invertebrados, siendo los caracoles su alimento preferido. Es una especie cinegética.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zorzal real
(*Turdus pilaris*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Zorzal grande, alcanza una longitud de unos 26 cm. Su dorso es de color castaño y la zona posterior de su cabeza, el cogote y capirote son de color gris azulado. La zona inferior de las alas es blanca y de color pardo en su parte superior. Su pecho es de color rojizo con motas negras, siendo el resto de sus partes inferiores de color blanco. Su cola es de color pardo.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zorzal charlo
(*Turdus viscivorus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Zorzal muy similar a los de su familia aunque este es el de mayor tamaño. Tonos pardos en el dorso y vientre claro con manchas. De comportamiento agresivo, atrevido, de gran tamaño, con una longitud de 25-30 cm, lo que lo convierte en el mayor pájaro cantor europeo. Se alimenta de insectos y larvas del suelo, así como de bayas y frutos.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Es el zorzal de menor tamaño, mide unos 20 o 22 cm. Su coloración es parda por encima, con las partes inferiores claras con rayado pardo. Su ceja clara bien marcada e infracoberteras alares de color castaño rojizo son las características que más le diferencian del Zorzal común.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Petirrojo
(*Erithacus rubecula*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Presenta dimorfismo sexual. Los machos adultos se distinguen por su pecho y frente roja, enmarcados en colores grises plumizos. La parte superior es de color pardo y el vientre blanquecino. La hembra y los juveniles presentan tonos muchos más pardos, menos llamativos que el macho. Tienen el pico fino típico de insectívoros. Habitan en bosques húmedos. Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Ruiseñor común
(*Luscinia megarhynchos*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Ave de unos 15-20 cm. Su plumaje es pardo en general, aunque más oscuro en el dorso y en el capirote que en el vientre. Ojo oscuro y pico pequeño. Esta especie es muy reconocida por su canto. Vive oculto en el bosque y se alimenta de insectos y gusanos. Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Roquero solitario o Mirlo azul (*Monticola solitarius*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Presenta un fuerte dimorfismo sexual. El macho tiene el cuerpo gris azulado y las alas y cola negro pizarroso. La hembra es parda azulada en las partes superiores y muy rayada en las inferiores, formando pequeñas bandas de color pardo sobre un fondo más claro. Pico largo y oscuro. Es típica de montañas y riscos, su dieta consiste en insectos, gusanos, pequeños vertebrados, caracoles, bayas, etc. Distribuida por toda la Península Ibérica aunque más abundante en la Costa Mediterránea.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Collalba rubia o turrонера
(*Oenanthe hispanica*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Careta, pico, patas, alas y cola de color negro, que contrasta con su vientre claro. Nuca, hombros y pecho de color rubio leonado. Vive en lugares áridos y soleados. Se alimenta de insectos principalmente, aunque puede comer arañas, pequeños moluscos y frutos.

Esta distribuida por toda la Península Ibérica, salvo el Norte.

Especie casi amenazada (UICN España).

Tarabilla común o carbonero (*Saxicola Torquata*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Turdidae*

Descripción: Pequeño tamaño, unos 13 cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho presenta un plumaje inconfundible, con toda la cabeza, dorso y alas negras, el cuello blanco por los lados (verano) o gris (invierno) y pecho de color rojizo. Vientre blanco, patas, pico y cola negra. Muestra en vuelo unas franjas alares blancas muy vistosas. La hembra es similar al macho pero sin la cabeza negra.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN Andalucía).

Alcaudón común (*Lanius senator*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Laniidae*

Descripción: Mide unos 20 cm. Presenta un capirote rojo en la cabeza, un antifaz oscuro y pico corto. Su barbilla, pecho y vientre son de color blanco, mientras que la mitad superior del cuerpo es negra, con dos grandes manchas blancas en las alas escapulares. Se alimenta de insectos como mariposas, saltamontes, arañas, etc.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie casi amenazada (UICN España).

Alcaudón real meridional (*Lanius meridionalis*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Laniidae*

Descripción: Color ceniciento. Tiene un antifaz, ojos, pico, punta de las alas y cola de color negro. Presenta un collar y cejas de color blanco, y un pecho más claro que el resto del cuerpo. Banda blanca cerca de la punta de las alas. Pico ganchudo y patas acabadas en garras fuertes que le permiten tener una dieta variada (insectos, pequeños mamíferos, pajarillos).

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie casi amenazada (UICN España).

Lavandera blanca o pipita (*Motacilla alba*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Motacillidae*

Descripción: Ave de unos 20 cm de longitud. Muy frecuente y fácil de identificar. La cabeza, garganta y la nuca son de color negro, mientras que las partes inferiores al igual que la cara y el cuello son blancas. El dorso es de color grisáceo. La cola destaca por ser larga y de color negro, con las plumas exteriores blancas. Es muy frecuente en hábitats urbanos y se alimenta fundamentalmente de pequeños insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Motacillidae*

Descripción: Ave de unos 20 cm de longitud. El color del dorso y la cabeza es grisáceo mientras que todo el vientre es amarillo. La garganta es de color negro y presenta una lista ocular blanca. La cola es larga con las plumas exteriores blancas. Es típica de hábitats ligados a cursos de agua dulce. Dieta consistente en dípteros.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Pico picapinos o pájaro carpintero (*Dendrocopos major*)



Orden: *Piciformes*

Familia: *Picidae*

Descripción: Ave de tamaño medio, con un diseño rojo negro y blanco. El bajo vientre es de color rojo, al igual que su nuca (las hembras no tienen la mancha roja en la nuca). Parte de su cara y la mayor parte de las alas son negras, mientras que el pecho, franjas alares, vientre y zona alrededor de los ojos son blancas. Esta especie se caracteriza por su costumbre de taladrar troncos.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Pito real
(*Picus viridis*)



Orden: *Piciformes*

Familia: *Picidae*

Descripción: Es grande y robusto, mide unos 30 cm de longitud. El pájaro carpintero de la Península más conocido y abundante. Dorso pardo verdoso, con vientre pálido con matices amarillentos en el obispillo. Su cabeza es muy llamativa, con capirote, nuca y bigotera rojos. Ojos amarillentos, pico largo y robusto que usa para taladrar árboles.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Críalo europeo
(*Clamator glandarius*)



Orden: *Cuculiforme*

Familia: *Cuculidae*

Descripción: Ave de mediano tamaño, de unos 40 cm. Tiene una gran cola de borde blanco y alas afiladas con mancha marrón. Dorso oscuro y bastante moteado de blanco. Parte ventral bastante clara con un tono amarillento en la garganta. Parte posterior de la cabeza de color negro con cresta erizable. Es una especie parásita en la reproducción, utilizando nidos de otros. Esta distribuida por toda la Península Ibérica salvo Cornisa Cantábrica.

Grado de amenaza desconocido (UICN España).

Cuco
(*Cuculus canorus*)



Orden: *Cuculiformes*

Familia: *Cuculidae*

Descripción: Cabeza y dorso gris, partes inferiores claras barradas, plumaje críptico. Pico fino, alas puntiagudas y cola moteada. Lo más característico de este pájaro es su canto. Se alimenta de insectos y es típico del sotobosque.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Chotacabras pardo
(*Caprimulgus ruficollis*)



Orden: *Caprimulgiformes*

Familia: *Caprimulgidae*

Descripción: Ave de hábitos crepusculares y nocturnos. Plumaje críptico, con la parte superior conformada por una mezcla de gris rojizo y pardo, con rayado negro denso en los hombros y el pecho. Tiene una forma aplanada y su pico es curvo, negro y pequeño. Se alimenta de insectos nocturnos. Es muy frecuente verlo sobre el asfalto.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte.

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía).

Agateador común (*Certhia brachydactyla*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Certhidae*

Descripción: Pequeño pájaro de unos 13 cm de longitud con diseño pardo manchado de blanco. Tiene un babero blanco, del que parte un pico largo y algo curvo. En el ala destaca una línea blanca en la parte exterior de la pluma más grande. A menudo se observa trepando por los troncos de los árboles. Es estrictamente insectívoro, se alimenta de adultos y larvas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Trepador azul (*Sitta europaea*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sittidae*

Descripción: Mide unos 12-14 cm sin cuello aparente, cabeza grande, pico largo y puntiagudo, patas robustas. Color azulado en el dorso, alas y cola, y pardo rojizo en la zona ventral. Presenta un antifaz oscuro que se inicia en el pico. En el macho, el tono anaranjado es más intenso que en la hembra. Vive en zonas húmedas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Alcaraván común
(*Burhinus oedicnemus*)



Orden: *Charadriiformes*

Familia: *Burhinidae*

Descripción: Mide hasta unos 45 cm presenta un plumaje de tonos arenosos, pardos claros y oscuros, manchados de negro. Ojos y patas de color amarillo. El pico es también amarillo, terminado en una punta negra. Presenta dos bandas blancas en las alas y en los bordes del ojo. Se alimenta de insectos, pequeños reptiles y mamíferos. Hábitats áridos y esteparios.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía).

Chochín (*Troglodytes troglodytes*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Troglodytidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño, de plumaje pardo y formas rechonchas. Dorso con barrado transversal oscuro. Presenta una ceja blanca sobre el ojo. Las partes inferiores son ocre, la cola es corta y barrada. Su dieta es insectívora. Cría en terrenos arbolados con sotobosque denso.

Distribuido por toda la Península Ibérica, aunque mucho más abundante en el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Carricero común
(*Acrocephalus scirpaceus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño, propia de lugares con abundante carrizo, cañas y juncos. Presenta una coloración general de tonos marrones claros, con la barbilla pecho y vientre aún más claros. Se alimenta de insectos básicamente. Vive próximo a lagunas, marismas, humedales, etc.

Distribuido por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño de unos 13 cm. Dorso castaño, cola larga y redondeada. Partes inferiores y cejas pálidas. Es similar al carricero, aunque se diferencia por tener 10 plumas en la cola en lugar de 12. Similar también al ruiseñor común, aunque éste es de mayor tamaño y más rechoncho. Habita en la maleza cerca de zonas húmedas. Come macroinvertebrados, semillas y frutos silvestres.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Buitrón
(*Cisticola juncidis*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño, con el dorso pardo rojizo, con listas oscuras inconfundibles. Alas pardas con ribetes blancos, partes inferiores blanco amarillento, cola característica con punta blanca, excepto el par central. Pico y patas de color pardo claro. Se alimenta de insectos y habita en zonas abiertas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Zarcero común
(*Hippolais polyglotta*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño, unos 13 cm. Muy similar al carricero común. Se diferencia de él por tener la ceja amarilla. Tiene el dorso de color verde oliva y las partes inferiores amarillentas. Pico y patas pardas. Debe su nombre a que es capaz de imitar el canto de otras aves como gorriónes, mirlos o currucas. Habita en bosques húmedos (zarzas) y se alimenta de insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Curruca capirotada
(*Sylvia atricapilla heineken*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Mide unos 15 cm. Presenta dimorfismo sexual. Dorso de tonos grises y partes inferiores pardo claras. Posee un capirote característico por encima de los ojos, negro en el macho y pardo rojizo en la hembra y juveniles. Cola de color pardo grisáceo sin blanco. Se alimenta de frutos e insectos y habita en zonas de sotobosque.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho adulto tiene un capirote negro que le llega hasta debajo de los ojos, espalda gris y partes inferiores blancas. La hembra tiene el capirote gris, espalda parda y partes inferiores parduscas. Ambos presentan anillo ocular rojo y patas claras.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo la Cornisa Cantábrica y partes de Castilla y León.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Curruca rabilarga (*Sylvia undata*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Sylviidae*

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. Ave de pequeño tamaño, unos 14 cm. Debe su nombre a su larga cola escalonada, con plumaje oscuro y manchas claras. El macho presenta un plumaje de cabeza y dorso de un color gris pizarra. Partes inferiores de un color rojizo con la garganta moteada de blanco. La hembra es de un tono pardo más uniforme y oscuro que el macho. Ambos presentan un anillo orbital rojo en los ojos. Distribuida por toda la Península Ibérica.
Especie de preocupación menor (UICN).

Alondra común
(*Alauda arvensis*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Mide unos 20 cm. Plumaje pardo color tierra listado en negro. Plumas externas de la cola blancas y borde también blanco en la parte posterior del ala. Cabeza con una pequeña cresta, ceja y semicollar claro. Es de hábitos esteparios, muy común en trigales. Se distribuye por toda la Península Ibérica aunque más común en el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cogujada común (*Galerida cristata*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Ave de tamaño medio propia de zonas áridas. Es muy similar a la Alondra común, aunque se diferencia de ésta por tener la cresta más larga y puntiaguda. Su plumaje es leonado en la parte superior y blancuzco en la parte ventral. El pico es más largo que el de la Alondra y está curvado hacia abajo. Se alimenta de semillas y de insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica, aunque menos abundante en el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Cogujada montesina (*Galerida theklae*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Ave de tamaño medio propia de zonas áridas. Es muy similar a la Cogujada común, aunque se diferencia de esta por tener un pico algo más ancho y corto, la forma de sus alas y las axilas más grisáceas. Su plumaje es leonado en la parte superior y blancuzco en la parte ventral. Se alimenta de semillas y de insectos. No convive con la Cogujada común, ya que ésta ocupa zonas de mayor altitud.

Distribuida por toda la Península Ibérica, aunque menos abundante en el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Terrera común
(*Calandrella brachydactyla*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Pájaro de pequeño tamaño, con el plumaje pardo con listado oscuro en la parte superior, y claro en la parte ventral. Pico y patas amarillentas. Se diferencia de la Totovía por ausencia de ceja clara y por la mancha negra de las coberteras primarias. Habita en terrenos agrícolas con cultivos y pastizal. Se alimenta de semillas e insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Totovía o cutulía (*Lullula arborea*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Pájaro de pequeño tamaño, plumaje pardo con listado claro en la parte superior, y uniforme en la parte ventral. Pico y patas claras. Se diferencia de la Terrera por su ceja clara. Habita en zonas de matorral y campos baldíos. Se alimenta de semillas e insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Calandria
(*Melanocorypha calandra*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Alaudidae*

Descripción: Mide unos 20 cm. Presenta las partes superiores de color pardo con bordes claros, con la cabeza sin cresta, con unas cejas marcadas y pico grueso y fuerte. Pecho ocre finamente listado y con dos manchas negras. Especie típicamente mediterránea. Se alimenta de insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Suele medir unos 12 cm. Su coloración es de lo más peculiar; parte anterior de la cabeza de color rojo intenso, píleo y ambos lados de la cabeza de color negro y el resto, de color blanco hasta la garganta. Nuca, manto y pecho de color beige. Flanco y vientre de color más claro, y en su ala se puede distinguir el color negro con una banda amarilla en la mitad.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Jamás o pardillo común (*Carduelis cannabina*)



Orden: *Passeriformes* **Familia:** *Fringillidae*

Descripción: Ave de unos 13 cm de longitud. Presenta un dorso pardo rojizo, con una franja alar blanca. La cola es escotada, con bordes blancos. El macho, en verano, al contrario que la hembra, presenta el pecho de un color rojo carmín. Habita sobre todo en zonas de cultivo y se alimenta de semillas e insectos. Su persistente canto hace que sea una de las aves de jaula favoritas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Verderón o verdón (*Carduelis Chloris*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Mide unos 15 cm, con una coloración general verde olivácea en los machos y un poco más parda en las hembras. Pico fuerte y claro. Características plumas amarillas en alas y cola. Vive en zonas urbanas y se alimenta de semillas y frutos silvestres. Muy cotizado para el reclamo y captura en silvestrismo.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Lúgano (*Carduelis spinus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Ave de pequeño tamaño y cola relativamente corta. Posee un pico bastante puntiagudo, de color ocre. Presenta una coloración de tonos amarillos, con la zona del vientre más clara y pequeñas manchas oscuras en el pecho, flanco y vientre. Alas más oscuras con franjas negras y amarillas bastante vistosas. La hembra es menos colorida y más listada. Cría en zonas montañosas de baja temperatura y elevada altitud. Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Verdecillo o Chamarí (*Serinus serinus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Es el más pequeño de los fringílidos, mide unos 10 cm. Presenta dimorfismo sexual. El dorso es amarillento rayado de pardo, capirote amarillo, pico ancho y corto. Macho con frente, ceja y pecho amarillos; hembra menos amarilla y más rayada. Habita en todo tipo de ambientes, aunque prefiere zonas antropizadas para recolectar el grano.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Picogordo
(*Coccothraustes coccothraustes*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Mide unos 17 cm. Presenta un pico cónico muy grueso. Cabeza con lista negra alrededor del ojo, pico y mentón. Collar grisáceo, dorso pardo con cabeza ocre. Vientre grisáceo claro, cola con plumas negras al igual que las alas, aunque éstas presentan manchas blancas. Habita en bosques caducifolios y zonas fluviales. Se alimenta de frutos y semillas.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Fringillidae*

Descripción: Ave de tamaño similar al del gorrión común, pero con la cola más larga y más esbelta. Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene la cabeza y cuello gris, pecho y mejillas rojizos. La hembra y los jóvenes son de color pardo, más oscuro en el dorso que el vientre. Tiene blancos los hombros, alas y cola. Es una especie omnívora, con hábitos forestales en primavera y de praderas y cultivos en invierno.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Avión común
(*Delichon urbica*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Hirundinidae*

Descripción: Pequeña ave bastante común, de unos 13 cm de longitud. Las partes inferiores blancas contrastan con las superiores, de color negro con reflejos azulados en el pecho, hombros y manto. La cola está algo ahorquillada, es negra y sin prolongaciones. Su pico es negro completamente. Vive en zonas urbanas, anida bajo cornisas, es insectívoro y rara vez se posa en el suelo salvo para beber y conseguir material para el nido. Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Golondrina común (*Hirundo rustica*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Hirundinidae*

Descripción: Es un ave de unos 20 cm que presenta una cola muy ahorquillada. Las partes superiores son de color azul metálico y las inferiores claras. Frente y garganta rojizas, con pico y patas cortas y negras. Se diferencia de la golondrina daurica en el cuello y el vientre, que en la daurica es anaranjado.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Golondrina daurica
(*Hirundo daurica*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Hirundinidae*

Descripción: Tamaño algo menor que la golondrina común. Presenta un obispillo de color ocre ligeramente alargado, lista ocular y nuca de color castaño. Dorso azul oscuro, vientre rosáceo, cola ahorquillada más corta que en la común y sin manchas blancas. Es insectívora estricta y habita en zonas rocosas y altas, aunque se adaptan con facilidad a ambientes urbanos.

Distribuida por el Suroeste de la Península Ibérica principalmente.

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía).

Avión roquero
(*Ptyonoprogne rupestris*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Hirundinidae*

Descripción: Muy similar al avión común, aunque este es de mayor tamaño. Su aspecto es de tono uniforme, de color pardusco grisáceo, con el dorso más oscuro que el vientre. Alas largas y puntiagudas, con cola ahorquillada con manchas blancas. Este avión no es de hábitos urbanos. Se alimenta de insectos voladores. Anidan en oquedades de las rocas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Escribano montesino (*Emberiza cia*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Emberizidae*

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual.

Se diferencia de los restantes escribanos europeos, en estado adulto, por su garganta gris ceniza. Macho con garganta y cabeza grises, píleo y cara con listas negras por encima y castaño por debajo. Hembra más apagada, con pecho y flancos algo listados. Habita en laderas rocosas y zonas montañosas con matorral bajo.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Triguero o triguera (*Miliaria calandra*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Embericidae*

Descripción: Ave de 16 a 19 cm de longitud. Cuerpo voluminoso y pico más grueso que otros escribanos. Presenta un plumaje parecido a la Totovía y Terrera, pardo listado por arriba y claro por abajo. Su cola no tiene colores blancos. Habita en zonas de cultivos agrícolas, especialmente trigales, que conforman el pilar básico de su dieta.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Herrerillo común (*Parus caeruleus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Paridae*

Descripción: Muy similar al Carbonero común. Se diferencia de este en la cabeza principalmente, que en este caso es blanca y azul, con sólo el antifaz en negro que rodea su cara, pasando por el cuello y llegando hasta el pico. Por lo demás, tiene el vientre amarillo atravesado por una línea negra, el dorso grisáceo azulado, al igual que las alas y la cola. Tiene una línea blanquecina en sus alas.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Paridae*

Descripción: Es de pequeño tamaño, de unos 11 cm de longitud. Se distingue con facilidad gracias a una llamativa cresta, de color blanco grisáceo y con rayado negro. Presenta un collar y barbilla negra, y el abdomen blanco. El dorso es de color marrón claro. Habita en bosque de frondosas y coníferas y anida en troncos de árboles caídos. Principalmente insectívoro.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Carbonero común (*Parus major*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Paridae*

Descripción: Cabeza negra con mejillas claras, blancas o amarillo muy pálido. El pecho es de color amarillo atravesado por una franja negra a modo de corbata que sale desde la cabeza. Esta línea es más ancha en los machos. El dorso es de color verde azulado, las alas y la cola de color azul.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Gorrión doméstico o de pueblo (*Passer domesticus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Passeridae*

Descripción: Es el pájaro europeo más común. Mide unos 15 cm. Presenta dimorfismo sexual, su coloración es parda, con dorso castaño y partes inferiores claras. Macho con cabeza de color castaño y capirote gris, con babero negro. Hembra más parda con ceja blanquecina. Habita en zonas urbanas, construye sus nidos sobre ramas u oquedades.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Gorrión molinero o de campo (*Passer montanus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Passeridae*

Descripción: Pequeño pájaro de unos 15 cm que presenta plumaje de tonos pardos con rayas negras en el dorso y gris pálido en la parte inferior. Presenta una característica mancha negra en cada una de las mejillas. Más pequeño y más rechoncho que el gorrión común. Se distribuye por toda la Península Ibérica.
Especie de preocupación menor (UICN España).

Vencejo común (*Apus apus*)



Orden: *Apodiformes* **Familia:** *Apodidae*

Descripción: Cola corta, algo ahorquillada y las alas largas puntiagudas. Plumaje negruzco con una porción blanca o gris bajo el pico. Patas cortas pero robustas, con estructuras de agarre para ramas y cornisas, ya que le cuesta mucho remontar el vuelo desde el suelo. Boca ancha y grande rematada con un pico pequeño. Se alimenta de pequeños insectos voladores. Hábitos urbanos.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Mito
(*Aegithalos caudatus*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Aegithalidae*

Descripción: Especie muy pequeña, de unos 14 cm, de los cuales aproximadamente ocho corresponden a la cola, que es de color negro y blanco. Plumaje negro, rosado y blanco. Presenta un distintivo semicírculo ocular amarillo y un pico muy corto. Se alimenta de insectos, arañas y semillas. Típico de ambientes con sotobosque.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).

Papamoscas gris
(*Muscicapa striata*)



Orden: *Passeriformes*

Familia: *Muscicapidae*

Descripción: Mide unos 14 cm de longitud. El plumaje es pardo grisáceo, blanco por debajo. Tiene rayas oscuras en cabeza y pecho. Los jóvenes poseen motas oscuras en el pecho. Presenta un estriado fino en cuello, flancos y pecho. Suele vivir tanto en zonas arboladas como urbanas y se alimenta de insectos.

Distribuida por toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (UICN España).