

## ***Tamaricaceae***



Arbustos o pequeños árboles. Sus hojas son alternas, simples, escamiformes, amplexicaules. Flores en racimos, actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, hipoginas; todas ellas reunidas en espigas o racimos. Los frutos son cápsulas.

- *Tamarix africana* Poir.
- *Tamarix canariensis* Willd.
- *Tamarix gallica* L.

## Tamaricaceae



**Nombre Científico** *Tamarix africana* Poiret

**Nombre Común** Taraje, Taraje negro

**Ecología** Arbusto o arbolillo caducifolio de 2 a 5 m de altura. Corteza negruzca o púrpura oscuro. Hojas muy pequeñas. Flores blancas o de un rosa pálido, que se agrupan en espigas gruesas y cilíndricas. Fruto tipo cápsula. Semillas numerosas con penachos de pelos. Florece de marzo a mayo. Habita en terrenos húmedos y algo salobres.

**Usos** Las ramas y cortezas se han usado en medicina popular como astringente, antiguamente se recomendaba para las obstrucciones del bazo y se fabricaban vasijas de madera para que bebieran en ella estos enfermos. Según la superstición popular si se les daba de comer a los cerdos en estas vasijas, al sacrificarlos aparecían sin bazo. Es planta ornamental.

## *Tamaricaceae*



**Nombre Científico** *Tamarix canariensis* Willd.

**Nombre Común** Taraje de Canarias

**Ecología** Arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 8 m de altura. Corteza pardo-rojiza, generalmente negruzca. Hojas pequeñas. Flores de color blanco o ligeramente rosado en racimos laterales o terminales en las ramas del año. Fruto tipo cápsula. Semilla con un penacho de pelos. Florece de mayo a agosto. Habita sobre suelos húmedos y encharcados por aguas salobres. No muy frecuente.

**Usos** Se utiliza la corteza como astringente. Presenta propiedades farmacológicas en afecciones de la piel. Su madera se utiliza en la fabricación de aperos y escobas.

## ***Tamaricaceae***



**Nombre Científico** *Tamarix gallica* L.

**Nombre Común** Taraje de Europa

**Ecología** Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio de hasta 8 m de altura. Corteza pardo-oscura o púrpura. Hojas muy pequeñas. Flores blancas o ligeramente rosadas en racimos laterales o terminales en las ramas del año. Fruto tipo cápsula. Semillas con un penacho de pelos. Florece mayo a junio. Habita sobre suelos húmedos y encharcados por aguas poco salobres. No muy frecuente.

**Usos** Se utiliza la corteza como astringente, para teñir, como combustible y curtiente. También tiene uso ornamental.